МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра органической и биоорганической химии

«Арил-замещенные пирролопиримидины в реакции алкилирования»

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

студента 4 курса 412 группы

направления (специальности) 04.03.01 «Химия»

Институт химии

Крайнова Михаила Николаевича

Научный руководитель (руководитель)

Кандидат химических наук _____ В.С. Гринёв

Зав. кафедрой

Доктор химических наук _____ О.В. Федотова

Саратов 2020

ВВЕДЕНИЕ

Азотсодержащие гетероциклы представляют особый интерес для органической химии из-за широкого спектра действия. В литературе известно много примеров применения гексагидропиримидинового кольца в качестве ключевых структурных единиц в многочисленных природных продуктах, лекарствах и биологически активных молекулах. Объединение гексагидропиримидинового и пирролидинового фрагментов могут усиливать лекарственную активность соединения или они могут обладать некоторыми новыми видами биологической активности.

До настоящего времени было разработано множество способов N-алкилирования аминов. Эти разработки, несомненно, способствовали расширению методов N-алкилирования, однако многие из них являются дорогими, либо неэффективными и характеризуются малым выходом желаемых продуктов. Нашей задачей является изучение возможностей N-алкилирования в условиях основного катализа на примере 8а-фенил- и 8а-(*n*-толил)-гексагидропирроло[1,2-*a*]пиримидин-6(2*H*)-она, которые являются относительно недорогими и доступными, что может быть важным фактором для дальнейшего использования как в сельском хозяйстве, медицине и фармакологии.

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Работа состоит из введения, 3 глав (1 глава – обзор литературы по теме исследования, 2 глава – цель исследования и обсуждения результатов, 3 глава – экспериментальная часть), выводов и списка литературы из 46 наименований. Работа изложена на 53 страницах, включает 14 рисунков и 3 таблицы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обоснована актуальность выбранной темы бакалаврской работы.

В **первой главе** представлен обзор научных работ, посвящённых конформационным особенностям и электронному строению изучаемых пирролопиримидинов, а также актуальным методикам и последним успехам в области алкилирования различных субстратов.

Во **второй главе** сформулирована цель работы, и обсуждаются результаты синтеза исходных пирролопиримидинов, их спектральных свойств, строения в кристалле.

В качестве исходных соединений в данной работе мы синтезировали двух представителей класса бициклических лактамов Мейерса, пергидропирролопиримидинов, и проводили реакции N-алкилирования полученных соединений в условиях основного катализа. Исследуемые пирролопиримидиноны были получены в результате гетероциклизации 4-оксо-4-арилбутановых кислот и 1,3-диаминпропана нагреванием в течение 2 ч реакционной смеси в среде толуола при постоянном азеотропном удалении образующейся в ходе конденсации воды с последующим удалением растворителя при пониженном давлении с выходами до 42.5%.

Синтез изучаемых бициклолактамов протекает согласно следующей схеме:

Алкилирование проводилось в среде сухого ацетона при температуре 55 °С при постоянном перемешивании в присутствии триэтиламина:

R = Ph, *p*-Tol; AlkHal = CH₃I, C₂H₅Br, C₂H₅Cl, *n*-C₈H₁₇I, *n*-C₉H₁₉Br

В результате были получены вещества **2-7**, согласно данным ТСХ, коэффициенты удерживания R_f которых отличались от таковых значений для исходных соединений (**1a,b**): R_f (**1a**) = 0.4, R_f (**1b**) = 0.41; R_f (**2**) = 0.55; R_f (**3**) = 0.6; R_f (**4**) = 0.58; R_f (**5**) = 0.49, R_f (**6**) = 0.6, R_f (**7**) = 0.7.

На основании спектральных данных был сделан вывод об образовании соответствующих N-алкилгалогенпроизводных **1a,b**. Так, в спектрах ЯМР ¹H присутствовали дополнительные сигналы в виде мультиплетов в сильном поле, характерные для алкильных фрагментов. В то же время сигнал протона вторичной аминогруппы сохранялся в спектре, что говорит об образовании четвертичных солей бициклолактамов **1a,b**.

С целью прогнозирования возможных направлений электрофильной атаки нами с помощью программы CrystalExplorer 17 неэмпирическим методом (волновая функция рассчитывалась в рамках DFT/B3LYP/6-311G(d,p)) для полученных бициклолактамов **1a,b** были построены диаграммы электростатического потенциала и предсказаны его положительные значения для обоих атомов азота и атома кислорода, что может говорить о том, что электрофильные реакции могут проходить по этим атомам, что предопределяет вероятность получения O-алкилированного продукта наряду с N-алкилированным (Рис. 1).

Однако *O*-алкильных производных выделено не было, что может говорить об относительно невысоком вкладе данных процессов при реакции **1a,b** с алкил галогенидами.

Синтезированные соединения, по данным ЯМР ^1H и ^{13}C спектроскопии, охарактеризованы как соответствующие алкильные пирроло[1,2-*a*]пиримидин-6(2*H*)-оны (**2-7**). В ЯМР ^1H спектрах всех соединений **2-7** протоны метильной группы *n*-толильного заместителя проявляются в виде синглета при 2.21 м.д.

В спектре ЯМР ^1H соединения **2** присутствует дополнительный сигнал протонов метильной группы четвертичного атома азота при 2.81 м.д. в виде синглета. Введение электронодонорного алкильного заместителя в 1-е положение пергидропиримидинового цикла вызывает некоторое смещение сигналов протонов наиболее удалённых от кватернизированного атома азота в сильное поле, а наиболее близких – в слабое, по сравнению с положением соответствующих сигналов в *n*-толилзамещенном бициклолактаме **1b**. Так, дублет дублетов протонов в 4-ом положении наблюдается при 3.87 м.д. с КССВ 13.5 и 5.0 Гц, протоны при 2-ом атоме углерода при 3.34 м.д. в виде квадруплета с КССВ 7.4 Гц, сильнополюсные сигналы протонов в 3-ем положении – в виде сложного мультиплета в диапазоне 1.35-1.56 м.д., тогда как в исходном бициклолактаме **1b** соответствующие сигналы наблюдались при 4.20, 2.62-2.90, и 1.43 м.д., соответственно.

В спектре ЯМР ^{13}C соединения **2** наблюдаются сигналы углеродов карбонильной группы при 176.3 м.д., характеристичный четвертичный при 92.7 м.д., а также сигналы ароматических и алкильных фрагментов.

В реакции *N*-алкилирования циклических аминов процесс затруднен из-за стерического фактора, поэтому в реакционную массу добавляется триэтиламин, служащий катализатором реакции. Предполагаемая схема взаимодействия включает в себя электрофильную атаку алкильного карбокатиона по вторичной аминогруппе бициклических лактамов **1a,b** с образованием промежуточного карбокатиона и последующих ионным взаимодействием с анионом галогена с образованием *N*-алкилированных бициклолактамов:

Поскольку в настоящее время накоплено большое количество структурных данных для множества рецепторов, моделирование непосредственного взаимодействия синтезированных соединений с наиболее перспективными из них позволяет не только учесть стерические, конформационные и другие факторы, но и вычислить энергию взаимодействия, а также наглядно проиллюстрировать, за счёт каких фрагментов молекул-лигандов происходит связывание в комплекс.

В качестве мишени нами был выбран ангиотензинпревращающий фермент 2 (АПФ2, международное обозначение ACE2), который является мембранным белком, катализирующим превращение ангиотензина I в ангиотензин 1-9 и ангиотензина II в ангиотензин 1-7. АПФ2 человека является рецептором и «точкой входа» в клетку некоторых коронавирусов, в частности SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, пандемия которого в настоящее время наблюдается по всему миру (общее число заражённых по состоянию на 21 мая 2020 г. более 5 млн. человек). Предполагается, что ингибиторы фермента АПФ2 могут обладать противовирусной активностью в отношении SARS-CoV-2. Структурные данные для молекулярного докинга были взяты из комплекса химерного рецептор-связывающего домена SARS-CoV-2 с АПФ2, депонированного в международной базе данных белков PDB под кодом 6VW1. Фермент АПФ2 имеет достаточно крупную полость, в которую могут входить крупные протяжённые молекулы. Электростатический потенциал фермента, в целом носит отрицательный характер, что говорит о том, что положительно заряженные лиганды могут потенциально иметь более высокое сродство к нему, по сравнению с электронейтральными.

В качестве лигандов были взяты исходные пирролопиримидины **1a,b**, а также их алкильные производные (N-метил **2**, N-этил **3**, **4**, **6**, N-октил **7** и N-нонил **5**) в виде катионов. В качестве лиганда-сравнения использовали антиретровирусный препарат *Маравирок (Maraviroc)*, антагонист рецептора CCR5, использующегося, в том числе, в лечении ВИЧ инфекции, имеющего некоторое структурное сходство с синтезированными нами лигандами, в

частности, имеется азациклогексановое кольцо, несущее положительный заряд на атоме азота, а также фенильный боковой заместитель.

Из полученных данных следует, что все исследованные лиганды имеют хорошее сродство к АПФ2. Введение в структуру более длинноцепочечного алкильного радикала приводит к уменьшению энергии рецептор-лигандного комплекса. Так, *N*-октилпроизводные **7** приближаются по энергии к лиганду сравнения, а уже *N*-нонилпроизводные **5** его заметно превосходят и демонстрируют наименьшую из исследованных молекул энергии комплексов.

Рисунок 2 – Структуры энергетически наиболее выгодного комплекса с АПФ2: общий вид комплекса с лигандом **5** (а), увеличенная область, показывающая координацию лиганда **5** (б)

На рисунке 2 представлено изображение комплекса АПФ2 с лигандом **5**. Связывание происходит путём стекингвых взаимодействий *n*-толильного заместителя лиганда **5** с остатком фенилаланина, гидрофобный *n*-нонильный радикал располагается вблизи двух остатков гистидина, вероятно связывание происходит путём нековалентных С-Н $\cdots\pi$ взаимодействий.

Таким образом, нами на основе 8а-(фенил)- и 8а-(*n*-толил)гексагидропирроло[1,2-*a*]пиримидин-6(2*H*)-онов (**1a,b**) был синтезирован его ряд *N*-алкилгалогенидов, представляющих собой продукты кватернизации данного бициклического лактама по атому азота вторичной аминогруппы, которые показывают выраженную аффинность к АПФ2, превосходя

антивирусный препарат Маравирок, и могут быть перспективны для дальнейших исследований противовирусной активности, и в частности, в отношении SARS-CoV-2.

В третьей главе приводятся экспериментальные подробности: перечень используемых реагентов, физико-химические методы анализа, синтеза конкретных соединений, молекулярного докинга.

ВЫВОДЫ

1. Предложен способ функционализации бициклолактамов 8а-фенил- и 8а-(*n*-толил)гексагидропирроло[1,2-*a*]пиримидин-6(2*H*)-онов – N-алкилирование в условиях основного катализатора триэтиламина, и разработаны соответствующие условия реакции.
2. С помощью квантовохимического моделирования исходных бициклолактамов неэмпирическим методом DFT выявлены потенциально активные в реакциях алкилирования фрагменты.
3. Показано, что синтезированные соединения являются продуктами реакции квантеризации бициклических лактамов по вторичной аминогруппе с соответствующими алкилгалогенами.
4. С помощью программы PASS была проведена виртуальная оценка биологической активности синтезированных продуктов, а методом молекулярного докинга была показана выраженная аффинность синтезированных соединений по отношению к рецептору АПФ2, участвующего в процессе заражения человека вирусом SARS-CoV-2.

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ АВТОРА

Статья в рецензируемом журнале, индексируемом Scopus и Web of Science:

1. Grinev, V.S., Linkova, E.I., Krainov, M.N., Dmitriev, M.V. & Yegorova, A.Y. Crystal structures, packing features, Hirshfeld surface analyses and DFT calculations of hydrogen-bond energy of two homologous 8a-aryl-2,3,4,7,8,8a-hexahydropyrrolo-[1,2-*a*]pyrimidin-6(1*H*)-ones //Acta Cryst. Sect. C, Vol. 76, P. 483-489.